

MASTIVAC®

Reg. SAGARPA.: B-0029-001

Bacterina para la prevención de la mastitis del ganado bovino.



Fórmula

Cada mL contiene cultivos inactivados de:

<i>Staphylococcus aureus</i>	≥12 X 10 ⁸ UFC
<i>Streptococcus agalactiae</i>	≥9 X 10 ⁸ UFC
<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	≥3 X 10 ⁸ UFC
<i>Streptococcus uberis</i>	≥3 X 10 ⁸ UFC
<i>Streptococcus pyogenes</i>	≥3 X 10 ⁸ UFC
<i>Escherichia coli</i>	≥18 X 10 ⁸ UFC
<i>Corynebacterium pyogenes</i>	≥12 X 10 ⁸ UFC

Adyuvante 20% del volumen final

Diluyente: Agua de calidad inyectable



Indicaciones

Prevención de la mastitis bovina.



Administración y dosis

Subcutánea en el cuello o detrás de la espalda. Aplicar dos inyecciones de 5 mL cada una con un intervalo de 15 días entre cada inyección. Primovacunación: Dos meses antes del parto. Revacunación: Anual.



Instrucciones y advertencias

Conservar el producto entre 2-8 °C, Mantener en un lugar fresco y protegido de la luz. Los envases usados y cualquier resto de contenido deberán ser eliminados en forma segura para el medio ambiente y de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia.

Uso en:



Presentaciones:

Frasco con 100 mL



USO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

® Marca Registrada